

## Se opp for agurkbladlus

Annichen Smith Eriksen

I august har jeg fått flere telefoner om angrep av agurkbladlus både i agurk og i blomster. Agurkbladlusen oppformerer raskt og kan gjøre stor skade på plantene med et klissent belegg. I agurk går bladlusa på agurkfruktene slik at det ikke blir salgbar avling.

Du har angrep av agurkbladlus hvis:

Bladlusa danner kolonier. Det er en blanding av lysegrønne små bladlus (barn) og store mørkegrønne bladlus (voksne). Alle bladlus (både små og store) har sorte ryggrør og antenner som er kortere enn kroppen.



Agurkbladlus i agurk og Begonia. Foto: A. Smith Eriksen.

### Bekjempelse i Prydplanter

- Sprøyt en gang med Confidor.
- Det er viktig å dekke de nederste bladene ved sprøyting siden Confidor er systemisk oppover i plantene.
- En sprøyting med Confidor er vanligvis nok. Pirimor virker IKKE på agurkbladlus.

### Bekjempelse i Agurk

- Sett ut snylteveps (*Aphidius colemani*) forebyggende 0,5 – 1 stk/m<sup>2</sup> en gang i uken.
- Ved angrep økes dosen til minimum 3 stk/m<sup>2</sup> eller mer en gang i uken inntil angrepet er under kontroll (mer enn 80-90 % parasittering).
- Agurkbladlus danner raskt store kolonier. Det er derfor behov for større doser med nyttedyr (snylteveps og gallmygg) for å få kontroll på denne bladlusen i forhold til flere andre bladlusarter.
- Ved angrep er det aktuelt og kombiner snylteveps og gallmygg (*Aphidoletes aphidimyza*).
- Ved store angrep vil ikke nyttedyrene virke raskt nok og du må sprøyte en gang med Confidor. Confidor er skadelig for alle nyttedyrene og har 4 dagers behandlingsfrist i agurk. Ta kontakt for mer info: [annichen.smith.eriksen@lr.no](mailto:annichen.smith.eriksen@lr.no) eller mobil 91386624.



Mumie (snylteveps) og gallmygglarve. Foto: A. Smith Eriksen